СИНИЙ ЙОД

Синий йод применяется как наружно, так внутренне. Внутренне принимается всегда натощак (за 30 минут до еды) в разбавленном в прохладной воде виде (не более 1:15).

Дозировки варьируют от 0,5 чайной ложки (2-3 мл) до 3 мл на 1 кг веса человека в сутки. В экстренных случаях до 1 литра в сутки.
Абсолютно не токсичен в выше названных дозах для организма человека, что подтверждают всесторонние клинические исследования Мохнача В.О. 1950-1980 гг.

Профилактические дозы приема:

- детям до 1 года – 2-3 мл день;
- детям от 1 года до 7 лет – 3-5 мл день;
- детям от 7 лет до 12 лет – 5-10 мл день;
- взрослым – 20-45 мл в день;
- беременным и кормящим матерям – 20-45 мл в день.

ВНУТРЕННЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Йододефицит	30-45 мл 2-3 раза в день в теч. 60-90 дн. Затем постоянно профилактически 20-45 мл 1 раз в день
Интоксикация (алкогольная, пищевая)	50-100 мл 2-3 раза в день с периодичностью в 1 час
Цистит	Принять 150-200 мл, а ч-з 40 мин. прием повторить
Стоматит, пародонтоз, зубная боль	Полоскать полость рта до обесцвечивания препарата 5-6 раз в день – 2-3 дня
Ангина, фолликулярная ангина, грипп, тонзиллит	30-45 мл 10-12 раз в день. Полоскания препаратом до обесцвечивания – 2-4 дня
Химический ожог пищевода	Как можно быстрее после ожога принять 15 мл препарата. Повторять каждые 15 мин. до 1000 мл/сутки, 10-30 дней до исчезновения симптомов ожога. Полоскать рот препаратом несколько раз в день
Дизентерия, колиты различной этиологии, диспепсия, диарея, язвы двенадцатиперстной кишки и желудка, метеоризм, дисбактериоз	10-20 ч.л. 5-6 раз в сутки 5-10 дней до полной нормализации стула. Через 1-2 дня от начала лечения вводить препарат (50 мл на стакан прохладной воды) в клизмах 1 раз в день
Гайморит, ринит, воспаление носоглотки	Часто орошать носовые пазухи и носоглотку, принимать внутрь 20-45 мл 3 р./день – 10-60 дней
Хламидиоз	Пить 150 мл 4 раза в день – 17-21 день
Нарушение функции печени и поджелудочной железы	Пить 10-15 ч.л. утром натощак 1 раз в день 2 недели

СИНИЙ ЙОД

Синий йод применяется как наружно, так внутренне. Внутренне принимается всегда натощак (за 30 минут до еды) в разбавленном в прохладной воде виде (не более 1:15).

Дозировки варьируют от 0,5 чайной ложки (2-3 мл) до 3 мл на 1 кг веса человека в сутки. В экстренных случаях до 1 литра в сутки.
Абсолютно не токсичен в выше названных дозах для организма человека, что подтверждают всесторонние клинические исследования Мохнача В.О. 1950-1980 гг.

Профилактические дозы приема:

- детям до 1 года – 2-3 мл день;
- детям от 1 года до 7 лет – 3-5 мл день;
- детям от 7 лет до 12 лет – 5-10 мл день;
- взрослым – 20-45 мл в день;
- беременным и кормящим матерям – 20-45 мл в день.

ВНУТРЕННЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Йододефицит	30-45 мл 2-3 раза в день в теч. 60-90 дн. Затем постоянно профилактически 20-45 мл 1 раз в день
Интоксикация (алкогольная, пищевая)	50-100 мл 2-3 раза в день с периодичностью в 1 час
Цистит	Принять 150-200 мл, а ч-з 40 мин. прием повторить
Стоматит, пародонтоз, зубная боль	Полоскать полость рта до обесцвечивания препарата 5-6 раз в день – 2-3 дня
Ангина, фолликулярная ангина, грипп, тонзиллит	30-45 мл 10-12 раз в день. Полоскания препаратом до обесцвечивания – 2-4 дня
Химический ожог пищевода	Как можно быстрее после ожога принять 15 мл препарата. Повторять каждые 15 мин. до 1000 мл/сутки, 10-30 дней до исчезновения симптомов ожога. Полоскать рот препаратом несколько раз в день
Дизентерия, колиты различной этиологии, диспепсия, диарея, язвы двенадцатиперстной кишки и желудка, метеоризм, дисбактериоз	10-20 ч.л. 5-6 раз в сутки 5-10 дней до полной нормализации стула. Через 1-2 дня от начала лечения вводить препарат (50 мл на стакан прохладной воды) в клизмах 1 раз в день
Гайморит, ринит, воспаление носоглотки	Часто орошать носовые пазухи и носоглотку, принимать внутрь 20-45 мл 3 р./день – 10-60 дней
Хламидиоз	Пить 150 мл 4 раза в день – 17-21 день
Нарушение функции печени и поджелудочной железы	Пить 10-15 ч.л. утром натощак 1 раз в день 2 недели

НАРУЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Конъюнктивит, ожог глазного яблока, ранение век и глазного яблока, блефенорея, гипертонический кератит, древовидный и дисковый кератит	Закапывать 2-3 капли в конъюнктивную полость 4 раза в день
Дополнительно при ожогах и тяжелых случаях	Смачивать 7-12 раз в день ожоговую поверхность или наносить с помощью спрея каждый час. Длительность – 7-20 дней
Геморрой	Тампоны с йодом на геморроидальные шишки. Менять по мере обесцвечивания
Трещины сосков у кормящих матерей	Смазывать 2-3 раза в день, оставлять на соске до полного высыхания – 2-3 дня
Послеродовые язвы промежности и частичное расхождение швов на промежности	После предварительной обработки раневой поверхности перекисью водорода и обсушивания нанести препарат – 5-7 раз в день, 3-4 дня
Трихомониаз, грибковые поражения вагины, уретры, шеечного канала, простатит	После удаления при помощи физраствора слизи и гнойных выделений тщательно обработать препаратом 3-4 раза в течение одной процедуры с последующим применением влагалищной ванночки из 15-20 мл препарата с димексидом 1:5, можно на ночь
Ожог	На поверхность накладывают 3-5 слоев марли, обильно смоченной препаратом. В большинстве случаев не требуется смена повязки, необходимо лишь дополнительное орошение после ее высыхания
Косметический эффект	Частое протирание кожи (разбавить прохладной водой в 2-5 раз) способствует улучшению регенеративных возможностей кожи (омолаживает)

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕ ВЫЯВЛЕНЫ
ВОЗМОЖНА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ

«КЛУБ ЙОДА»: 02094, г. Киев, ул. Попудренко, д.52, оф.206

+38 098 2016188 | www.iodclub.com | info@iodclub.com

КЛУБ ЙОДА
ЙОД - ОСНОВА ЖИЗНИ

НАРУЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Конъюнктивит, ожог глазного яблока, ранение век и глазного яблока, блефенорея, гипертонический кератит, древовидный и дисковый кератит	Закапывать 2-3 капли в конъюнктивную полость 4 раза в день
Дополнительно при ожогах и тяжелых случаях	Смачивать 7-12 раз в день ожоговую поверхность или наносить с помощью спрея каждый час. Длительность – 7-20 дней
Геморрой	Тампоны с йодом на геморроидальные шишки. Менять по мере обесцвечивания
Трещины сосков у кормящих матерей	Смазывать 2-3 раза в день, оставлять на соске до полного высыхания – 2-3 дня
Послеродовые язвы промежности и частичное расхождение швов на промежности	После предварительной обработки раневой поверхности перекисью водорода и обсушивания нанести препарат – 5-7 раз в день, 3-4 дня
Трихомониаз, грибковые поражения вагины, уретры, шеечного канала, простатит	После удаления при помощи физраствора слизи и гнойных выделений тщательно обработать препаратом 3-4 раза в течение одной процедуры с последующим применением влагалищной ванночки из 15-20 мл препарата с димексидом 1:5, можно на ночь
Ожог	На поверхность накладывают 3-5 слоев марли, обильно смоченной препаратом. В большинстве случаев не требуется смена повязки, необходимо лишь дополнительное орошение после ее высыхания
Косметический эффект	Частое протирание кожи (разбавить прохладной водой в 2-5 раз) способствует улучшению регенеративных возможностей кожи (омолаживает)

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕ ВЫЯВЛЕНЫ
ВОЗМОЖНА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ

«КЛУБ ЙОДА»: 02094, г. Киев, ул. Попудренко, д.52, оф.206

+38 098 2016188 | www.iodclub.com | info@iodclub.com

КЛУБ ЙОДА
ЙОД - ОСНОВА ЖИЗНИ